

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
18.05.2013 № 396
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8240/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.06.2017 № 732

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БОМ-БЕНГЕ

Склад лікарського засобу:

1 г мазі містить:

діючі речовини: левоментол – 39 мг, метилсаліцилат – 202 мг;
допоміжні речовини: парафін жовтий м'який, парафін.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь від білого, жовтувато-білого до жовтого кольору із запахом ментолу і метилсаліцилату.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А 504.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування при болях в суглобах і м'язах. Код АТХ M02A C.

Комбінований препарат для зовнішнього застосування.

Метилсаліцилат має протизапальний, знеболювальний, подразнювальний та відволікаючий ефекти, в основі яких лежить вплив на підвищену проникність капілярів, процеси мікроциркуляції, гальмування активності медіаторів запалення, у тому числі брадикініну, що має альгогенну дію. Подразнення ментолом чутливих нервових закінчень призводить до легкого місцевого знеболювального ефекту.

Показання для застосування.

Ревматизм (суглобовий та м'язовий), ішіас, артрит, невралгія, ексудативний плеврит.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, захворювання шкіри, ушкодження, рани шкіри у місці нанесення препарату.



Належні заходи безпеки при застосуванні.

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Не застосовувати особам, схильним до алергічних реакцій на компоненти препарату.

Препарат наносити на неушкоджені ділянки шкіри.

Після кожного застосування мазі ретельно мити руки. При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність препарату під час вагітності та в період годування груддю не вивчались.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не застосовують у дітей віком до 3 років через вміст ментолу у препараті.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують зовнішньо. Втирають 2-3 рази на добу в болючі ділянки тіла, у тому числі грудної клітки (при плевриті). Після втирання мазі рекомендується накладати суху зігріваючу пов'язку. Тривалість застосування зумовлена характером і вираженістю захворювання, характером супутньої терапії, досягнутим ефектом.

Передозування.

Посилення проявів побічних реакцій чи відчуття сильного тепла та печіння у місці нанесення мазі.

Побічні ефекти.

Відчутті холоду, потім тепла, слабкого печіння та поколювання. Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, кропив'янку, контактний дерматит, свербіж, які потребують відміни препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г у тубах, по 25 г у банках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Текст узгоджено
30.05.2017